

Bylo vaše děťátko odesláno k vyšetření průchodnosti slzných cest?

Mezi projevy neprůchodnosti slzných cest patří většinou jednostranné potíže typu slzení, hlenová sekrece spojivek a opakované záněty spojivek.

Slzné cesty mohou být neprůchodné z celé řady příčin, nejčastěji však v důsledku vrozené neprůchodnosti. Nejedná se o něco neobvyklého, ba naopak. Až 70 % dětí nemá v době narození průchozí slzné cesty.


Ve většině případů dojde k samovolnému zprůchodnění slzných cest během 2. – 4. měsíce věku dítěte. Proto je vhodné dát přírodě prostor, aby problém sama vyřešila a vyšetření podstoupit nejdříve ve věku 3,5 měsíců.

Nejprve je proveden diagnostický průplach slzných cest, kdy je pomocí kanyly do slzných cest aplikován sterilní roztok. Pokud se projeví neprůchodnost, je u dětí do jednoho roku věku přistoupeno k sondáži, čímž rozumíme zprůchodnění slzných cest pomocí tupé sondy.

Jedná se o zákrok, jehož bolestivost je srovnávána s bolestivostí při očkování dítěte. I přesto se k sondáži v ambulantním provedení nepřistupuje po 12 měsících života, aby si dítě na zákrok nepamatovalo.


Pokud si kladete otázku, jaké jsou alternativy invazivního zprůchodnění, existuje také konzervativní terapie - tedy neinvazivní. Jedná se o aplikaci desinfekčních kapek (Omisan baby/Ocuflash blue), či v opodstatněných případech antibiotických kapek. Aplikují se do spojivkového vaku 4x denně a po aplikaci následuje masáž slzného vaku, aby se zvýšil tlak v slzných cestách, což přispěje ke zprůchodnění slzných cest.

Toto doporučujeme provádět od začátku potíží. Pokud však potíže přetrvávají až do 4. měsíce věku dítěte, je šance na samovolné zprůchodnění minimální a je na místě léčit neprůchodnost slzných cest sondáží. Pokud je dítě starší jednoho roku, provádíme na našem pracovišti pouze diagnostický průplach a následně je dítě odesláno na vyšší pracoviště ke zprůchodnění slzných cest v celkové anestezii.



Instrukce pro rodiče, jejichž dítě bylo odesláno k vyšetření průchodnosti slzných cest

- 1) Dostavte se na naši ambulanci v úterý mezi 13. - 14. hodinou - bez objednávky. Nahlaste se v registru.
- 2) Připravte si žádanku, pokud nějakou máte.
- 3) Po příchodu svlékněte dítěti bundičku, svetrík či mikinku- během vyšetření bude zabaleno do roušky pro znehybnění během zákroku a zbytečně by se přehřívalo.
- 4) Nevstupujte do ambulance s kočárkem - nechejte jej prosíme na chodbě pro zachování dostatečného prostoru při vyšetřování.
- 5) Je vhodné, aby během vyšetření rodiče vyčkali v ambulanci, neboť během vyšetření není možný přímý kontakt s dítětem - je totiž potřeba fixace pacienta zdravotnickým personálem. Rodič by tak stál jen opodál a vyšetřovanému by nijak neulehčil, ba naopak by v případě nepohody přitížil všem zúčastněným. Vyšetření včetně případného zprůchodnění trvá ve většině případů maximálně 5 minut. Poté je vám děťátko předáno zpět a můžete jej ukonejšit.
- 6) Vyčkejte na lékařskou zprávu.



V případě nejasností se obraťte na lékaře. Jsme tady pro vás a uděláme vše pro to, aby pacient dostal léčbu, kterou potřebuje.